

LACTODIP PLUS

PRODUIT DE TREMPAGE POUR LA DÉSINFECTI- TION ET L'ENTRETIEN DES TRAYONS

LactoDip Plus est une solution prête à l'emploi pour la désinfection des trayons en élevage. S'utilise comme trempage immédiat après la traite.

PROPRIETES

LactoDip Plus est un produit de trempage à base de 10 % (100 000 ppm) d'acide lactique et de 1 % (1 000 ppm) d'acide glycolique, avec un film protecteur visible, aux propriétés bactéricides prouvées. LactoDip Plus contribue au maintien des trayons doux et soignés grâce à l'ajout de glycérine. Il renforce la résistance naturelle de la peau des trayons. Son pH ajusté de manière optimale garantit une hygiène et une protection maximales. LactoDip Plus offre une excellente solution pour la désinfection des trayons et leur maintien en bon état. Il est économique à utiliser car il n'y a pas de perte de goutte à goutte.

MODE D'EMPLOI

LactoDip Plus est prêt à l'emploi et à appliquer sur les trayons immédiatement après la traite. Il peut être utilisé 1 à 3 fois par jour. La température ambiante idéale pour l'utilisation est de 20°C. Pour garantir un temps de contact suffisant, veiller à ce que le produit ne soit pas enlevé après l'application. Laisser le produit sur les trayons et veiller à ce que les animaux restent debout pendant au moins cinq minutes après l'application du LactoDip Plus pour la désinfection post-traite.

Avant la traite :

Tirez les 2 ou 3 premiers jets de lait de chaque trayon. Nettoyez et soignez les trayons en appliquant un pré-trempage approprié. Utilisez de préférence les produits de pré-trempage Mammi Foam. Nettoyez ensuite les trayons et essuyez-les. Utilisez une lavette différente pour chaque vache afin d'éviter toute contamination croisée.

Trempage manuel :

Remplir le réservoir du gobelet de trempage avec le LactoDip Plus. Après la traite, tremper chaque trayon en veillant à ce que toute la longueur du trayon soit immergée dans le désinfectant. Après la traite, vider le réservoir et nettoyer le gobelet en le rinçant à l'eau claire.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Conserver dans le contenant d'origine. Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri du gel. Stockage : 0 -30 °C. Durée de conservation : 12 mois.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations sur l'utilisation, la manipulation et le transport du produit en toute sécurité.



ANIMAL CARE

HYGIENE DE LA MAMELLE

TREMPAGE
(APRES TRAITE)

MATIERES ACTIVES

ACIDE LACTIQUE
ACIDE GLYCOLIQUE

UTILISATION

PROFESSIONNELLE



REF: AH-UDD-03009

LactoDip PLUS 20KG

REF: AH-UDD-03010

LactoDip PLUS 200KG