

# HEXIMINT DIP

## TREMPAGE POUR LA DÉSINFECTION ET L'ENTRETIEN DES TRAYONS

Heximint Dip est une solution de désinfection des trayons prête à l'emploi en élevage. Utilisé comme trempage immédiatement après la traite.

### CARACTÉRISTIQUES

Heximint Dip est un produit désinfectant de trempage prêt à l'emploi à base de 0,50% (5 000 ppm) de digluconate de chlorhexidine et de 0,1% d'acide glycolique. Il permet de prendre soin de l'état de la peau des trayons grâce à une composition unique. HexiMint Dip contient de l'huile essentielle de menthe pour un effet rafraichissant. Il est économique à utiliser car il n'y a pas de perte goutte à goutte. Son pH de 6 correspond étroitement au pH naturel de la peau et sa teneur en émoullissants permet de prendre soin des trayons.

### UTILISATION

Heximint Dip est prêt à l'emploi. Appliquer sur les trayons immédiatement après la traite. Peut être utilisé 1 à 3 fois par jour. La température ambiante idéale d'utilisation est de 20°C. Pour garantir un temps de contact suffisant, il convient de veiller à ne pas retirer le produit après application. Laissez le produit sur les trayons et laissez les animaux se tenir debout pendant au moins cinq minutes après le traitement pour la désinfection après la traite.

#### Trempage manuel :

Dans le cas des vaches à problèmes retirez les 2-3 premiers jets de lait de chaque trayon et récupérez-les dans un gobelet pour premiers jets de lait adapté.

Nettoyez et entretenez les trayons en appliquant le prétrempage approprié. Utiliser de préférence les agents de prétrempage Mammi Foam. Ensuite, nettoyez et essuyez complètement les trayons.

Utilisez un papier différent pour chaque vache afin d'éviter la contamination croisée. Remplissez le réservoir du gobelet de trempage avec le produit. Après la traite, traitez chaque trayon en vous assurant que toute la longueur du trayon est immergée dans le désinfectant. Après la traite, videz le réservoir et nettoyez le gobelet de trempage en le rinçant à l'eau claire.

### STOCKAGE ET CONSERVATION

Conserver dans le contenant d'origine. Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri du gel. Stockage : 0 -30 °C. Durée de conservation : 24 mois.

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations sur l'utilisation, la manipulation et le transport du produit en toute sécurité.



ANIMAL CARE

#### HYGIENE DE LA MAMELLE

TREMPAGE  
(POST-TRAITE)

#### MATIERE ACTIVE

DIGLUCONATE  
DE CHLORHEXIDINE  
ACIDE GLYCOLIQUE

#### USAGE

PROFESSIONNEL



RÉF: AH-UDD-04003

HEXIMINT DIP 20KG

RÉF: AH-UDD-04004

HEXIMINT DIP 200KG

**AGRIVET**  
WHEN HEALTH MATTERS ■■■

info@agrivet.eu - www.agrivet.eu

**ARMOSA**  
keeping nature at its best