

BACTOSEC

Complexe bactérien.

Utilisation

Traitement biologique des litières paillées.

Méthodes d'application

Les doses d'utilisation indiquées ci-contre sont adaptées en fonction de chaque type de production. Pour les litières particulièrement humides (à proximité d'abreuvoirs, humidité stagnante), il convient d'augmenter ces doses dont une proportion d'un tiers.

PRODUCTIONS BOVINES, OVINES, CAPRINES, ÉQUINES ASSAINIR ET PRÉCOMPOSTER

L'asséchant bactérien BACTOSEC est particulièrement recommandé pour les litières de longue durée afin d'exploiter :

- les capacités asséchantes des argiles
- l'activité bactérienne

Dans le but de limiter l'échauffement des litières, d'assainir par compétition et d'induire un pré-compostage en stabulation.

VOLAILLES : TRAITEMENT DES LITIÈRES	
Animaux	Doses d'utilisation par semaine en g
Vaches laitières ou allaitantes	400 g / vache
Génisses	400 g / vache
Taurillons	400 g / taurillon
Veaux	200 g / veau
Chevaux	400 g / cheval
Ovins/Caprins	100 g / animal

PRODUCTIONS AVICOLES ET CUNICOLES ASSÉCHER ET AMÉLIORER L'AMBIANCE

- BACTOSEC s'applique par épandage manuel 7 jours après la constitution ou le renouvellement de la litière.
- Le traitement des fientes en fosses ou pré-fosses augmentera la matière sèche des déjections et réduira les odeurs d'ammoniac..

VOLAILLES : TRAITEMENT DES LITIÈRES	
Animaux	Doses d'utilisation par semaine en g
Poulets de chair	1,25 g / poulet
Dindes	1,5 g / dinde
Palmipèdes élevage	2,5 g / palmipède



COMPOSITION

Complexe bactérien, nutriments, complexe minéral asséchant (argiles et squelettes d'algues marines), extraits de plantes fixatrices d'ammoniac, arôme d'eucalyptus.

USAGES AUTORISÉS

Professionnel

LIEUX D'UTILISATION

Bâtiment d'élevage

RÉFÉRENCE(S)

HY-DEI-02005 : Sac de 25 Kg

ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,
Parc de la croisée, B1-B2,
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 04.90.02.16.20
M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAMR040124



BACTOSEC

VOLAILLES ET LAPINS : TRAITEMENT DES FIENTES

Animaux	Doses d'utilisation par semaine en g
Poulets pondeuses	1,75 g / poule
Lapins maternité	20 g / cage / mère
Lapins engraissement	3 g / lapin
Palmipèdes gavage	4 g / palmipède

PRODUCTIONS PORCINES

ASSAINIR ET LIQUÉFIER

- BACTOSEC s'utilise sur les aires bétonnées ou paillées ainsi que les caillebotis.
- Il convient également pour la liquéfaction des lisiers et facilite leur écoulement en pré-fosses.

PORCS

Animaux	Doses d'utilisation par semaine en g
Truies gestantes et verrats	1,25 g / poulet
Truies maternité	1,5 g / dinde
Porcelets post sevrage	2,5 g / palmipède
Porcs en engraissement	90 g / porc

Conditions d'application : BACTOSEC s'applique la première fois 2 à 3 jours après la mise en place, ou le renouvellement, de la litière. Ensuite, il doit être épandu une fois par semaine avant le paillage.

Conservation

18 mois dans un endroit sec.



COMPOSITION

Complexe bactérien, nutriments, complexe minéral asséchant (argiles et squelettes d'algues marines), extraits de plantes fixatrices d'ammoniac, arôme d'eucalyptus.

USAGES AUTORISÉS

Professionnel

LIEUX D'UTILISATION

Bâtiment d'élevage

RÉFÉRENCE(S)

HY-DEI-02005 : Sac de 25 Kg

ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,
Parc de la croisée, B1-B2,
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 04.90.02.16.20

M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJMR040124



ARMOSA