

Protecta

Gardez le meilleur de la nature

ANTI-PAPILLONS & CHARANÇONS ROUGES DU PALMIER

Nématodes



Composition

Boîte prépayée comprenant un code de commande pour 25 millions de nématodes, un bon de réduction pour un piège charançon et une notice explicative. Utilisable en Agriculture Biologique selon la réglementation européenne en vigueur.

Description

Solution curative de lutte naturelle contre les papillons et charançons rouges du palmier. Le nématode *Steinernema carpocapsae* se déplace dans les cavités et irrégularités du palmier à la recherche de larves de charançon rouge du palmier et de papillon ravageur du palmier. Il s'introduit dans le corps du ravageur afin de procréer, ce qui entrainera sa mort dans les jours suivants.

Etant donné que le charançon rouge du palmier dévore le coeur de la plante hôte, les signes les plus visibles des attaques n'apparaissent souvent que bien après le début de l'infestation. Il est possible de détecter la présence de charançon rouge au moyen d'un piège de détection à combiner avec une phéromone attractive. C'est pourquoi, un remboursement de 5€ sur un piège à charançon + phéromone Protecta est offert à l'achat d'une boîte de nématodes.

Méthode d'application

Les nématodes doivent être commandés sur le site www.protecta-insects.eu dès les premiers signes d'infestation. Les nématodes sont expédiés chaque lundi, mardi et mercredi et livrés dans les 48 à 72h après expédition.

Si les nématodes ne peuvent pas être installés dès réception, il est possible de les stocker au réfrigérateur jusqu'à la date limite d'utilisation.

- 1 - Arroser l'arbre ou les arbres à traiter (10 litres d'eau 30 minutes avant)
- 2 - Diluer le contenu d'un sachet dans au moins 5 L d'eau
- 3 - Mélanger 3 minutes pour mettre les nématodes en suspension
- 4 - En cas de forte infestation, passer à l'étape 5. En cas d'infestation moyenne, compléter le mélange avec 5L d'eau (traitement de 2 palmiers) ou 7L d'eau (traitement de 3 palmiers) et agiter de nouveau.
- 5 - Pulvériser le mélange sur le haut du tronc (stipe) sur un mètre jusqu'au bourgeon terminal (l'apex), en insistant au niveau de la couronne (insertion des palmes sur le stipe). Continuer à agiter le mélange pour éviter le dépôt des nématodes dans le fond de l'appareil.
- 6 - Renouveler les nématodes après 1 mois.

ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,
Parc de la croisée, B1-B2
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 04.90.02.16.20
M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJCD200623

CIBLE

Papillons et charançons rouges du palmier

PÉRIODE D'APPLICATION

De avril à octobre

SURFACE TRAITÉE

Jusqu'à 3 palmiers

RÉFÉRENCE

PV-AUX-02002: 6/ carton

